


מבני נתונים

תרגול 2



ליאור שפירא

עצי חיפוש בינאריים



□ לכל קודקוד 4 שדות

■ left – מצביע לבן שמאלי

■ right – מצביע לבן ימני

■ p – מצביע לאב

■ key – מפתח

כל המפתחות בתת עץ ימני $< v.key <$ כל המפתחות בתת עץ שמאלי

תרגיל

□ בהינתן עץ חיפוש בינארי (בעל n צמתים), הדפיסו את כל המפתחות בו, בסדר ממוין, בזמן $O(n)$

In-order(v)

If ($v == \text{null}$) return

Else

In-order(v.left) ? גודל תת עץ שמאלי

Print v.key ? זמן קבוע (1)

In-order(v.right) ? גודל תת עץ ימני

Return

End if

תרגיל

□ בהינתן עץ חיפוש בינארי (בעל n צמתים), הדפיסו את כל המפתחות בו, בסדר ממוין, בזמן $O(n)$

In-order(v)

If ($v == \text{null}$) return

Else


In-order(v.left) ? גודל תת עץ שמאלי

Print v.key ? זמן קבוע (1)

In-order(v.right) ? גודל תת עץ ימני

Return

End if



ההוכחה: באינדוקציה, עוברים על כל צומת פעם אחת ולכן $O(n)$

תרגיל Amortized

- הראו כיצד לממש ADT של מחסנית (לא מוגבלת) בעזרת מערך, כך שכל פעולה תיקח $O(1)$ Amortized וגודל המערך תמיד יהיה $O(n)$ כאשר n מס' האברים במחסנית
- אנו נראה פתרון בו גודל המערך קטן שווה ל-4 פעמים מס' אברי המחסנית

□ הפתרון

- נגמר מקום במערך \leftarrow מגדיל פי 2
 - נשארו $\frac{1}{2}$ מהאברים \leftarrow נקטין פי 2
- לא טוב, ייתכן מצב בו נגדיל
נקטין כל הזמן, יקר!

□ פתרון אחר

- כשנגמר המקום נגדיל פי 2
- כשהמערך מלא רק עד כדי $\frac{1}{4}$ נקטין פי 2

מימוש הפתרון

Initialization

Size \leftarrow 0
Max-size \leftarrow 2
A \leftarrow array of size 2

Push(S,x)

If (size < max-size)
 A[size+1] \leftarrow x
 Size \leftarrow size + 1
Else
 A' \leftarrow new array of size 2*max-size
 A \leftarrow A' (+copy)
 max-size \leftarrow max-size*2
 A[size+1] \leftarrow x
 Size \leftarrow size + 1
End if

- Size - מס' האברים במחסנית \square
- Max-size - גודל המערך \square
- A - מערך בגודל Max-size \square

Pop(S)

Return-value = A[size]
Size \leftarrow size-1
If (size < max-size/4)
 A' \leftarrow array of size max-size/2
 A \leftarrow A' (+copy)
 Max-size \leftarrow max-size/2
End if

המשך התרגיל...

- משפט: עלות ה-Amortized היא $O(1)$
 - פעולת הכנסה יקרה \leftarrow המערך $1/2$ מלא
 - פעולת הוצאה יקרה \leftarrow המערך $1/2$ מלא
- למה 1 – תמיד אחרי פעולה "יקרה" המערך $1/2$ מלא
- למה 2 – נניח Op_1 פעולה יקרה, ו- Op_2 הפעולה היקרה אחריה. נניח שאחרי Op_1 גודל המערך k אזי בין Op_1 ל- Op_2 יש לפחות $k/4$ פעולות
- הוכחה
 - אחרי Op_1 גודל המחסנית הוא $m/2$
 - אזי, אם Op_2 פעולת הגדלה, אז עד אליה יהיו $m/2 \leq$ פעולות
 - אם Op_2 פעולת צמצום, אז עד אליה יהיו $m/4 \leq$ פעולות. מ.ש.ל

הוכחת המשפט (שיטת הבנק)

□ תזכורת:

amortized(op) = cost(op) – withdrawal + deposit ■

amortized(op) = O(1) נרצה להוכיח שכל פעולה ■

□ במקרה שלנו:

■ כל פעולה תפקיד 4 מטבעות

■ פעולה יקרה תמשוך מטבעות בגודל המערך שהיא מקצה

■ נרצה להראות שהפעולות הזולות משלמות על הפעולה היקרה שבאה אחריהן

□ פעולת הגדלת מערך

■ עולה m (העתקה של m)

■ לפניה היו לפחות $m/4$ פעולות שהפקידו 4, כלומר $4 \cdot \frac{m}{4} = m$

■ לכן, הבנק תמיד בפלוס, ועלות כל פעולה מכוסה

הוכחת המשפט (שיטת הפוטנציאל)

□ נרצה להגדיר פונק' פוטנציאל Φ כך ש:

■ $\Phi(\text{start})=0$

■ $\Phi(\text{end})\geq 0$

□ תזכורת: $\text{amortized}(op) = \text{cost}(op) + \Delta\Phi$

□ נרצה להוכיח שלכל פעולה $\text{amortized}(op) = O(1)$

□ נגדיר את Φ :

$$\Phi = \begin{cases} \frac{\text{max size}}{2} - \text{size} & \text{if } \text{size} < \frac{\text{max size}}{2} & \text{בהורדה} \\ 2(\text{size} - \frac{\text{max size}}{2}) & \text{if } \text{size} > \frac{\text{max size}}{2} & \text{בהוספה} \end{cases} - 1$$

בעזרת Φ ניתן לעשות דברים "עדינים" יותר משיטת הבנק